


Průzkum entomofauny a arachnofauny v Kamýku nad Vltavou



Pavel Jakubec
2010

Úvod

Na tomto místě se většinou autor rozepisuje o zachovalosti a biologické zajímavosti lokality. Bohužel tentokrát je nutná drobná výjimka z tohoto pravidla.

Území je silně antropogenně ovlivněno. Především vlivem okolní zástavby, ale v neposlední řadě se k tomu přidává i opevnění břehů Vltavy, které tak neposkytuje vhodné úkryty ani dostatek potravy pro případné vodní živočichy. Po vydatnějších srážkách, které byly například letos těsně před mou návštěvou, se můžeme setkat se stavem, že není možné najít ani v tišinách prakticky žádné bezobratlé, protože je silný proud odnesl dolů po toku.

Břehy mají ruderalní charakter s četnými nepůvodními druhy rostlin, které si sebou v některých případech přinesli i své přirozené nepřátele. Pouze některé části mapovaného území jsou obhospodařovány a využívány pro odpočinek a mají odlišný charakter. Jedná se především o kosené trávníky na hřištích a plátcích na břehu. Zde je však nalezení bezobratlých (hlavně několik týdnů po zásahu) značně obtížné, především z důvodu absence kvetoucích rostlin.

Metodika

Průzkum jsem prováděl pouze v jednom termínu a to 21.8.2010. Proto absentují druhy například jarního aspektu, ale také toho podzimního, kdy je větší šance najít například střevlíkovité brouky.

K lovu jsem z technických pomůcek používal smýkáci síť, sklepávací síť a vodní sítko, ale také jsem hledal pod kameny nebo na květech.



Mapka se zaznačenými jednotlivými lokalitami

Popisná část

Lokalita 1.



Popis: Prudký vydlážděný břeh, zarůstající ostružiníkem. Místy trsy divizny a dalších bylin.

Druhy: slunéčko (*Harmonia axyridis*), slunéčko (*Coccinella septempunctata*), mravenec (*Myrmica* sp.), běžník, šídelko, mandelinka, škvor obecný (*Forficula auricularia*), dřepčík, nosatčík (*Protopion apricans*), vosík francouzský (*Polistes gallicus*), pestřenka (více druhů), nosatec (*Cionus hortulans*)

Doporučení: Sběr v tomto místě je poměrně obtížný, právě díky porostu ostružiníku.

Poměrně dost druhů se dá zahlédnout na kvetoucích diviznách. Nosatec *Cionus hortulans* je na ně dokonce svým vývojem vázaný. Dá se na tomto místě předpokládat i výskyt nosatce (*Anthonomus rubi*), který se vyvíjí v růžovitých rostlinách a je v těchto místech velmi běžný.

Lokalita 2.



Popis: Ruderál s výskytem janovce metlatého, mydlice lékařské a řady bobovitých rostlin.

Druhy: pestřenka, vosík francouzský (*Polistes gallicus*), Čmelák polní (*Bombus pascuorum*), ploštice, saranče, skákavka, sluněčko, nosatčík (*Exapion furcistrotris*), sekáč, křižák, běžník zelený (*Diaea dorsata*), lovčice, vroubenka smrdutá (*Coreus marginatus*), komár pisklavý (*Culex pipiens*), škvor obecný (*Forficula auricularia*), kněžice., bělásek zelný (*Pieris brassicae*), modrásek, kněžice pásovaná (*Graphosoma italicum*), krytohlav, zrnokaz, potápník (*Agabus* sp.), mravenec (*Myrmica* sp.), klíště obecné (*Ixodex ricinus*), pěnodějka, osenice černolemá (*Noctua janthina*), lumek, mravenec (*Myrmica* sp.), nosatčík (*Ischnopterapion virens*), trněnka rudonohá (*Tiphia femorata*)

Doporučení: Na janovec metlatý je vázaný nosatčík *Exapion furcistrotris* a na bobovitých by se mohli vyskytnout další nosatčíci (určování není příliš jednoduché a stačí pouze vědět, že se jedná o brouka s dlouhým noscem a rovnými tykadli, velikost maximálně 4 mm). Na dalších kvetoucích bylinách a především okoličnatých se vyskytuje poměrně velké množství různého blanokřídlého hmyzu, ploštic, křísů a samozřejmě pavouků.

Lokalita 3.



Popis: sekaný trávník pod jírovci s velkým množstvím kvetoucích bylin.

Druhy: pestrokrovečník včelový (*Trichodes apiarius*), pěnodějka, kněžice, moucha domácí (*Musca domestica*), buzučivka, skákavka, dřepčik, škvor obecný (*Forficula auricularia*), mšice, běžník, saranče, komár pisklavý (*Culex pipiens*), nosatčík (*Protapion apricans*), kobylka, pestřenka, ohniváček černoskvrnný (*Lycaena tityrus*), lumek, kněžice pásovaná (*Graphosoma italicum*), kovolessklec gama (*Autographa gamma*) (znám také jako můra gama), ruměnice pospolná (*Pyrrhocoris apterus*), výkalnice, hrotař, lalokonosec, listopas čárkovaný (*Sitona lineatus*), zlatoočka skvrnitá (*Chrysopa perla*)(larva), bělásek zelný (*Pieris brassicae*), vosík francouzský (*Polistes gallicus*), vosa, včela medonosná (*Apis mellifera*), modrásek, křížák, blýskáček, chvostoskok, ohniváček černoskvrnný (*Lycaena tityrus*), slunéčko sedmítečné (*Coccinella septempunctata*), mravenec (*Myrmica* sp.), kvapník, pískorypka (některá ze samotářských včel), trněnka rudonohá (*Tiphia femorata*), klíněnka jírovcová (*Cameraria ohridella*), kobylka bělopásá (*Leptophyes albobittata*)

Doporučení: Na tomto místě se dá ukázat prakticky téměř vše zajímavé, co se v okolí nachází. Druhová diverzita je nejlepší ze všech předchozích i nadcházejících lokalit a zejména díky více druhům motýlů a blanokřídlých působí velmi hezky i na pohled. Je dobré se zaměřit na prohlídku květů a občas se podívat i blíže do trávy, kde se dají najít menší střevlíčci, chvostoskoci a sarančata, která tu jsou opravdu na každém kroku. Na jírovcích se zde vyskytuje invazní klíněnka jírovcová, která minuje v listech, které je možné vidět po celý rok.

Lokalita 4.



Popis: Sadová zahrada s poměrně zajímavým podrostem lučních bylin (hvězdnicovité, bobovité,...).

Druhy: včela medonosná (*Apis mellifera*), vosy, pestřenka, moucha domácí (*Musca domestica*), saranče, kobylka, kněžice, mravenec (*Myrmica* sp.), nosatec, běžník, slunéčko.

Doporučení: Na hnijící ovoce se slétá velké množství hmyzu. V době mé návštěvy to byly především vosy a včely, ale milují ho také motýli, kteří by se zde jistě dali také nalézt, kdyby bylo možné provést více prohlídek.

Lokalita 5.





Popis: Kosený trávník, který přechází v pobřežní hustší porost. Ze stromů stojí za povšimnutí lípy a vrby.

Druhy: žlabatka, ruměnice pospolná (*Pyrrhocoris apterus*), slíďák, nosatčík, pilatěnka, komár pisklavý (*Culex pipiens*), pestřenka, bělásek zelný (*Pieris brassicae*), modrásek, kněžice, kříš, babočka poví oko (*Inachis io*), dřepčík vrbový (*Crepidodera aurata*), trněnka rudonohá (*Tiphia femorata*)

Doporučení: Jedna z méně zajímavých ploch. Což je způsobeno především pokosením trávníku těsně před návštěvou, které značně ztížilo hledání. Na vrbách se zde vyskytuje velice hezky vypadající dřepčík vrbový, který se dá snadno zahlédnout, jak sedí na listech a to i ve velkých počtech. Ve spodní části kmenů lip zase s oblibou sedávají ruměnice pospolné. Na porostech okolo Vltavy by se snad dali zahlédnout různé druhy vážek a šídélek.


Obrazová příloha:




Saranče (nymfa)




Ohniváček černoskvřinný (*Lycaena tityrus*) (samice)



Pestřenka a mravenec



Čmelák polní (*Bombus pascuorum*)



trněnka rudonohá (*Tiphia femorata*) (vlevo) a lumek (vpravo)




Pestřenka (vlevo) a trněnka rudonohá (*Tiphia femorata*) (vpravo)



Kobylka bělopásá (*Leptophyes albobittata*)



Křížák



Píd'alka



Ještěrka obecná



Křižák a drobné nymfy poštic



Skákavka



Trněnka rudonohá *Tiphia femorata* – parazitická vosička



Ruměnice pospolná *Pyrrhocoris apterus*